Inserm
Institut national
de la santé et de la recherche médicale

ORS
OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET LA VACCINATION EN FRANCE

P. Verger

Observatoire régional de la santé Paca - UMR 912 SESSTIM – Inserm-IRD-AMU (Marseille)

12ème matinée thématique du Collège des Economistes de la Santé. La vaccination en France, le 29 juin 2017, Paris

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES : PIVOTS DE LA VACCINATION EN FRANCE…

- ✓ A l'interface entre pouvoirs publics et population générale
- ✓ Ecoutés par leurs patients (recommandations)
- ✓ Une relation de confiance des patients construite dans un rapport de proximité

…MAIS AU CŒUR D'ENJEUX SOCIÉTAUX

- ✓ Multiplication des controverses vaccinales
- ✓ Crise de confiance dans la sécurité des vaccins
- ✓ Discours de promotion de la santé prônant l'autonomie de l'individu dans la gestion de sa santé (A. Giddens)…
- ✓ … mais se retournant contre lui-même
  - ➢ Diffusion horizontale d'informations discordantes
  - ➢ Désenchantement vis-à-vis de la science (U. Beck)

DES MG FAVORABLES À LA VACCINATION, MAIS TRAVERSÉS PAR DES INCERTITUDES

- ✓ 80 % très favorables à la vaccination en général
- ✓ 85 % favorables à des vaccins obligatoires
- ✓ Des perceptions communes à celles du public :
  - ➢ 25 % des MG doutent de l'utilité de certains vaccins recommandés par les autorités
  - ➢ 33 % pensent que des complications à long terme, liées aux adjuvants dans les vaccins, sont probables

Source : projet « Médévac, 2014-2016 » dans le cadre du panel 3 de médecins généralistes de ville, soutenu par : DREES, Ex-Inpès, IRESP

DES PRATIQUES DE RECOMMANDATION DES VACCINS HÉTÉROGÈNES

Fréquence déclarée de recommandation par les MG de différents vaccins aux groupes cibles

% lignes, données redressées, N = 1582	Jamais	Parfois	Souvent Toujours
ROR aux adolescents ou jeunes adultes non immunisés	4	13	83
Méningocoque C en rattrapage de 2 à 24 ans	18	26	57
Méningocoque C chez les nourrissons de 12 mois	16	17	68
HPV aux filles de 11-14 ans	10	17	72
Hépatite B en rattrapage chez l'adolescent	11	26	63
Grippe saisonnière aux adultes diabétiques <65 ans	5	12	84

[Verger et al., EBioMedicine, 2015]

HÉSITATION VACCINALE DES MG & CONFIANCE RELATIVE DANS LES AUTORITÉS

- ✓ Hésitation modérée à forte chez 14 % des MG
- ✓ Faible chez 68 %
- ✓ Des autorités de santé influencées par l'industrie pharmaceutique pour 53 % des MG
- ✓ 29 % des MG préfèrent se fier à leur propre jugement plutôt qu'aux recos vaccinales

Source : projet « Médévac, 2014-2016 » dans le cadre du panel 3 de médecins généralistes de ville, soutenu par : DREES, Ex-Inpès, IRESP

DÉCALAGE ENTRE ATTENTES SOCIÉTALES VIS-À-VIS DES MG ET LEUR PRÉPARATION À LA VACCINATION

- ✓ Les MG au cœur d'une politique vaccinale populationnelle, mais :
  - ➢ Des doutes sur sa complexité, son efficacité
  - ➢ Un sentiment de manque de soutien des autorités
  - ➢ Un cursus, centré sur la pratique individuelle,
  - ➢ ne les préparant à pas aux enjeux actuels de la vaccination
  - ➢ Faible utilisation d'outils pour les aider dans leurs tâches

PISTES POUR AIDER LES MG DANS LA VACCINATION DE LA POPULATION

- ✓ Pas de réponse univoque et simple
- ✓ Besoins multiples
  - ➢ Mieux informer les MG (réactivité…)
  - ➢ Les former aux « savoir-faire » avec les personnes hésitantes
  - ➢ Outils pédagogiques pratiques pour les patients, et de suivi du statut vaccinal
- ✓ Faire du « sur mesure »
- ✓ Nécessité d'essais d'intervention